

三疣梭子蟹增养殖技术(II)

TECHNOLOGY OF MULTIPLICATION AND CULTIVATION OF *Portunus trituberculatus*

王浦东

(山东省海水养殖研究所 青岛 266002)

4 人工育苗的有关问题

4.1 亲蟹的暂养与孵化

育苗生产用的雌蟹一般是抱卵的自然蟹,有时也选用些尚未抱卵的。在蟹网船捕获的产卵群体中,挑选活泼健壮、附肢完整、卵色鲜艳呈橙黄色的雌蟹,一般规格是头胸甲宽范围 13.0~22.0cm,体重范围为 150.0~500.0g,运输过程中不能缺氧,轻放勿挤压。

将亲蟹逐批放入同一暂养池,池底事先铺 10~15cm 经淘洗过的细沙。为产卵同步,也可将抱卵和未抱卵蟹分别放置。每日投喂 1~2 次,时间根据情况可放在早、晚,投饵量一般为体重的 5~8% (平均 100g 亲蟹白天摄食量为 1.7g, 夜间为 3.6g, 日摄食率为 5.3%)^[1]。如蟹刚入池时出现不摄食现象可少投。饵料应以活蛤肉、沙蚕(烫死投喂)等为主,或投少量小杂鱼虾。每天上午换水一次,日换水量可为 1/3,同时清除残饵。在水温、盐度等都正常情况下,未抱卵的亲蟹会先后抱卵,抱卵的亲蟹将第一次孵出幼体。待半月左右,将会第二次产卵抱卵(二次利用)。亲蟹从产受精卵开始要经过 15~20d 左右的胚胎发育,卵子直径由 390μm 左右逐渐增到 420μm 左右。色泽由桔黄色到黑灰色逐渐加深,心跳频率自初期的每分钟十几次逐渐增加到 200 次以上,这时,出现身体抖动频繁而剧烈,预示幼体要破膜而出。根据亲蟹一般夜间孵出幼体的习性,在出现 100 次心跳时的傍晚或白天即将亲蟹用抄网捞入孵化箱内,翌晨检查是否孵出;将孵出的幼体经计数后,选优法将亲蟹移入培育池,并及时投饵。待亲蟹腹部回收后,捞出放回暂养池,继续培养。当夜未孵出者可放入暂养池的网箱中单养,以便观察和再次取出。刚做这项育苗工作的人员,为了观察胚胎发育情况,致使胚胎损失过多,往往出现胚胎发育不健康和招致寄生虫侵袭的现象,这一点须引起重视,一要消毒观察用具,二要注意多从表观现象积累

经验确定其孵化时间。

另外,日本有些水产场在亲蟹入池时,水池上面设有黑色遮光帘。

4.2 幼体培育

4.2.1 设施 培育幼体目前可以用对虾、贝类育苗所用设施,要分别有育苗室、单胞藻培养室、轮虫培养室、卤虫孵化室。各室要有充气、供水、供暖设备,其中轮虫培养室,不少单位不予重视,而轮虫却是蚤状幼体变态、生长的关键饵料。以上四者水体的比例一般可为:1 : 0.3~0.4 : 1~2 : 0.3~0.4。培育轮虫也可用室外土池,每个 200m² 左右为宜,池深 1~1.5m。室内水泥池,每池容量 10~15m³ 为宜,池深 1~1.5m,池内应设加温管、充气管、海水管等,如无条件建池,可与卤虫孵化池并用。另外水质条件要备有二级以上过滤海水系统。

有关设施应注意:(1)按育苗所用最大充气量 5% 选定充气设备,风压 0.5kg/cm²。充气最好采用罗茨鼓风机,因风量大,风压稳,配用电机较小,适用于大规模的育苗生产,便于调节育苗前、后期的不同充气量。小型的鼓风机,在育苗后期充气量不足,会加强自残。充气可采用气泡石或充气管针孔,气泡石规格采用 60 粒度砂轮气石,使用 80 粒度时,后期气流过缓。(2)按每平方米池底面积 1~1.5 只较好,气石布置定点呈梅花五点型或六点蜂窝型,有规则整齐的四点方型和三点三角型布置时,很易形成有规则的水中旋涡,使幼体和饵料快速下沉不再浮起。充气量原则是,蚤 I ~ III 期微波到略有水波, IV 期加强,大眼后加强至沸腾状,以减少自残机会。(3)各育苗池室要设有预热池,水体比例按 5 : 1,即 500m³ 水体育苗室,必须备有 100m³ 水体预热池,预热池内设多圈或多层加热管,保证换等温水之需要。这一点在部分育苗场还仍未进一步改进。

4.2.2 水质管理 调节水质要注意:(1)提高水质本身自净能力,培育幼体前将池水中添加适宜小球藻

(密度200000~800000个细胞/ml),并加适量扁藻(10 000~50 000个/ml),三角褐藻或小新月藻等,施肥繁殖蚤Ⅲ期后,为保护水质,应维持硅藻密度,水色呈橄榄色或褐色为宜,大眼幼体期,因投饵、残饵、排泄等原因,应尽量稳定硅藻数量,提高池水自净能力。(2)海水经沉淀、过滤系统入池时,滤网网目大小在蚤状期、大眼期、幼蟹分别为150目、80目、0目。这样前期基本上消除了海水中一定生物对幼体带来的危害,后期又可使适宜的自然饵料或称调节水质的生物得以通过。(3)换水。培育开始时,水体可占池容量的60~80%,以后逐渐增加,直至蚤Ⅰ期时加大到最高水体,蚤Ⅱ期第二天开始换水,日换水量为培育水体Ⅲ~Ⅳ期为30~40%,大眼期增加到50~80%,幼蟹期增加到80~100%。后期换水可分早、晚两次进行。换水网目分别是:蚤Ⅰ期用60~80目,Ⅲ~Ⅳ期用40目,大眼期用30目,大眼末期以后用20~18目。(4)水质监测。保证每日两次,在换水前取水样。在培育水温22~27℃范围内,盐度25~30,pH8.0~8.5、氨氮0.4mg/L以下、溶氧5~7mg/L情况下,幼体一般发育正常。但在气温、海水自然水温较高情况下,要特别注意pH和氨氮这两项指标的变化,及时采取相应措施。(5)吸污与倒池在蚤状幼体后期,进入大眼期前,应用末端装“鸭嘴”的虹吸管吸除池底污物1次,改善水质条件,提高大眼变态成活率,吸污应在早晨

或傍晚进行。当吊网后就不便吸污了。倒池的措施,可在蚤Ⅳ期采用,虽可使大眼期成活率得到提高,但在Ⅳ期容易受到损失,一般是在必要时采用,吸污与倒池的措施,在掌握不利情况下,会产生不良后果,因此要严格掌握。(6)光照一般控制在1500~2000lux之间,但要均匀分散,可用帘及时遮挡;聚光会引起幼体聚堆,局部水质恶化,幼体大量死亡。

4.2.3 幼体密度 从成活率和出池密度看,布幼体密度越高,则对育苗设施条件、水质状况、饵料质量、人工管理水平就要求越高,生产中也曾出现高密度布幼体,低产量或不稳产的结果。根据山东大部分育苗场的设施状况,水质情况和技术管理水平分析,一般密度应控制在100 000~200 000只/m³之间。

蚤Ⅰ期质量的好坏,直接影响到后期的发育,一般有质量好的蚤Ⅰ幼体,可顺利通过蚤状期,但蚤Ⅰ期质量不好,蚤Ⅱ的成活率将明显下降,蚤Ⅲ、Ⅳ或大眼期会出现大量死亡,或者各期幼体发育不同步。这与亲蟹质量有直接关系。因此,在孵化初期,蚤Ⅰ阶段用选优法来克服上述现象。选优法即是将幼体停气分层,取上、中层幼体入培养池,底层幼体抛弃。

4.2.4 饵料品种和投饵量 投喂饵料一般要求用生物饵料,但生产中也能搭配使用代用饵料,如制作高质量的配饵和蛤肉、虾肉、蛋黄、蛋羹等。

表3 梭子蟹各期幼体投饵品种和投饵量

饵料品种	蚤Ⅰ期	蚤Ⅱ期	蚤Ⅲ期	蚤Ⅳ期	大眼初期	大眼后期	幼蟹期
单胞藻($\times 10^4$ 个细胞/ml)	20~30	15~20	保持适量	保持适量	保持一定	保持一定	/
轮虫(个/日·只幼体)	20~40	30~60	60~80	80以上	/	/	/
卤虫无节(初)(尾/日·只幼体)	4~5	5~10	10~15	15~20	30~50	/	/
卤虫无节(后)(尾/日·只幼体)	/	/	/	/	/	100~140	180~240
蛋黄(个/m ³ ·日)	1/3~1/2	1/3~1/2	1/2~2/3	/	/	/	/
蛋羹(g/ $\times 10^4$ 只·日)	/	/	/	3~5	7~10	10~15	15以上
蛤肉、糠虾(g/ $\times 10^4$ 只·日)	/	/	/	3~5	5~6	8~15	15~20
微囊饵料(g/ $\times 10^4$ 只·日)	Φ5~10mm 0.25~0.5	Φ10~15 0.6~0.8	Φ15~20 0.8~1.0	Φ20~25 1.0~1.2	Φ25~30 1.2~1.5	Φ30~40 1.5~2.0	Φ40~50 2.0~2.5

注:表中投饵量是每种饵料单独投喂时的参考量。

日本对初孵幼体曾投海洋小球藻,后转投卤虫无节幼体及轮虫,尔后又使用高桥伊雄等的所谓“有机悬浮物”,使生产密度显著提高,近年来,柏谷芳夫等以轮虫为主要饵料,蚤Ⅱ后投喂经搅拌机粉碎的鱼肉、厚壳贻贝、磷虾等,已有较好的饲喂效果。试验结果:蚤Ⅰ期要投轮虫,并保持一定单胞藻浓度(10 000~20 000个细胞/ml以上)进入蚤Ⅲ、Ⅳ期后,开始投卤虫无节幼体,如在轮虫供应不足情况下,应在Ⅱ期时尽早投卤虫无节幼体,甚至可提前到蚤Ⅰ末投喂,提前可用8目筛绢过

滤,以防过大卤虫流入池内,造成争氧争饵。大眼幼体投以体长1mm以上的卤虫、后期无节幼体和以40~60目筛绢过滤的“有机悬浮物”。幼蟹期则投喂剁碎后,先经80目洗滤,又经1.6mm纱网过滤的文蛤肉、糠虾肉或少量鱼肉、蛋羹。为了保持水质,凡用过滤的代用饵料,要经粗、细两遍过滤,去粗、去细后,再行投喂。投喂次数一般在4~6次/日,要根据幼体肠胃饱食程度和幼体实际密度,以及活饵料密度、残饵情况等随时调整。投饵方式采取勤投和几种饵料间隔交替使用原则。为防止高密度

培育幼体后期时的互残现象,饵料必须满足供应。根据小生产数据和生产性的验证,提出以下参考用量(表3)。

饵料质量这一问题是育苗成功的关键因素之一,要以鲜活生物饵为主,幼体前期(蚤I、II),不能忽视单胞藻和轮虫的作用,特别是经营养强化后的轮虫(加不同维生素,乌贼肝油等营养强化)。这时,蚤状期变态和蚤状变大眼期的成活率起到关键作用。如生产试验观察前期处理不当,直接发育到蚤I时,即可出现变态死亡高峰。或者在变大眼幼体时出现延期和较低的成活率。当幼体质弱时,对后期水环境的恶化趋势反应很灵敏,氨氮有时由120mg/L增加到150mg/L或200mg/L时,即出现大批死亡。饵料质量直接影响到幼体的发育、变态、成活率和产量。

4.2.5 防止互残 幼体培育期内,成活率是一个致关重要的问题,引起成活率不高的原因,除了育苗经验,饵料质量,水质恶化、病害等因素外,其中很重要的因素是,当培育至大眼幼体后的“互残”。据观察,在24h内,幼体可减少10~20%,这一数据相当惊人,当蜕皮时这一现象表现更突出。幼蟹期的互残也很严重,特别将不同期的幼蟹放在一块时,大吃小的现象就会发生,育苗池内常可见幼体相抱而食。

防止自残法有以下几种:(1) 蚤I期密度的控制,日本密度为20 000尾左右/m³以下,在我国该项试验已达300 000只/m³,在一定条件保证下,可做到100 000~200 000只/m³;(2) 尽量保持幼体同步发育;(3) 连续充气,加大充气量,使幼体尽量分布均匀;(4) 用加入扁藻等方法提高池水的透明度;(5) 放置吊网设施。大眼幼体和幼蟹有喜附于其他物体上的特性,根据这一特性可考虑设置多种设施,如10~16目网片,草耙子等使幼体得到疏散,减少自残,吊网设置原则是:一要可随水升降,二要底部有较好的固定,池中可用浮子和石沉坠子调节。

4.2.6 预防病害 育苗中,各种病害威胁极强,必须在每个环节上以防为主。

(1) 亲蟹处理。在越冬亲蟹中已发现(海阳、莱州)甲壳溃烂病已明显影响到越冬期间的成活率,有的死亡率已达20~30%。几年育苗中观察海捕亲蟹在暂养期间,聚缩虫、钟形虫等附着在卵块表面现象较普遍,因此在卵孵化前。一般采取药浴处理,用1%新洁尔灭或用 10×10^{-6} 浓度的孔雀石绿海水药浴,进行消毒40~60min,然后再移入孵化箱或笼中进行孵化,效果较好。(2) 消毒培养池及用具。培育前必须用 100×10^{-6} 左右漂白粉和高锰酸钾进行交替消毒洗刷,半天或一天后,再用过滤海水冲洗干净。(3) 培育幼体期间适时用药、

清污和换水,隔日于换水前使用呋喃西林,喹乙醇等药物,用量 $0.5 \sim 1 \times 10^{-6}$,关于土霉素原粉药物,在亲蟹饲养水体中使用后,明显抑制摄食和正常活动,对培育幼体有待进一步试验。如幼体已附着聚缩虫时,可按0.6%浓度的新洁尔灭或0.5~1%福尔马林进行水体消毒,杀灭聚缩虫后,立即换水,不会影响幼体变态发育。(4) 注意供水系统的洁净。

按上述各项培育要求管理,日平均水温在22~25℃(21~27℃范围)每期幼体约需3~4d即可变态1次,整个育苗过程为18~23d左右发育到幼蟹I期。

4.3 出池与运输

可将池水水位下降1/3~1/2,用抄网采捕或在排水口采捕,方法是先用虹吸法,吸入池外排水口安装的采集网内(网内要保持1/2水位,保证幼体仍在水中,不致受伤),再用手抄网捞取幼体,转放到一定容器中,如100L或300L聚乙烯水槽中,边搅拌边充气,待一定数量后,以重量法计数。

幼体85~90%变为稚蟹时,就应及时出池(大眼幼体开始放网附着)。

运输可采用水运法。将50cm×50cm×75cm的双层聚乙烯袋中装入海水,水体40~50L,以消毒洗净的稻壳或蓬松的海草做附着基,将1 500~2 500尾幼蟹移入水袋中,使之均匀附着后,充氧封口遮光起运。路途远、气温高时,可在双层袋间放少量碎冰,附着物可防止损伤和抱团。特别当幼蟹期后,步足很容易自切,放入足够的附着物才可运输。

1994年7月23日试验。水运法做6组平行样,每组用双层塑袋内盛30L海水,放入100g幼体,平均2 400只(幼蟹平均甲宽0.75cm,平均12 000只/500g),每袋内隔袋500g散冰,袋内装细条状海草(经高锰酸钾消毒洗净)250g,在气温35℃,池水水温32℃状况下,经6h运输。各组幼体活力正常,成活率均在95%以上。

干运试验。细条状海草放于塑箱内,周围放入冰块,使幼体均匀分布于湿海草中经4h40min运输,尔后用22℃水温缓解幼体,成活率50%。由于放冰位置不当冻死和压死的占1/3,如能隔层放冰运输,成活率会在70%以上。

为了能放养较大的幼蟹,在7月17日用第9天的幼蟹做试验如下。幼蟹规格:平均1 150只/500g,甲壳宽1.2cm。环境条件:池水水温26~27℃,盐度30。在50、40、30、15、10L海水(5组)双层塑袋中分别放入100g幼蟹,平均每袋为230只,每袋外放1 500~2 000g冰块,水温降至16℃以下充氧封口起运,袋内未放附着基,经5h10min运输,(集苗时间3h50min不包括在内),5组活

力均明显减弱,最差的10L水体组死亡1/3,并且自切现象严重。40L水体组成活率为80%,50L水体组为87%,成活均不如7月23日小幼蟹。此次运输不理想主要是无附着基和幼体过大造成。

水运法运输关键在于附着基、适宜降温、充氧和适宜密度4项措施。

5 人工养成的有关问题

在梭子蟹养殖生产刚发展的同时,认真把研究和生

产模式的有关技术问题归纳起来,对防止生产上的“起伏”是相当重要的,现提出以下几点问题共同讨论。

5.1 场地选择与改造

5.1.1 位置 应选在风浪平静的内湾或池塘、海水流动交换好、潮差较大、有利池塘进排水、盐度变化不大的位置。池塘应建在高潮线与低潮线中区,低潮线的底部,如图1所示。原有些虾池建的不标准,使进排水存在很大问题,选择蟹池应注意。




图1 平均潮位(半日潮每年12个月的最高水位、最低水位线)

5.1.2 底质 蟹池的底质应以泥沙或沙泥质为好,不但有利水质清洁,更适于蟹的潜伏、蜕皮后期育肥和越冬,底质很硬或淤泥过多的虾池应铺沙10~15cm,形状成长条或方块状的沙块以改善池底。

5.1.3 隐蔽物 用水泥管、半圆形瓦片或竹筒、石板石块等设置一些隐蔽场所,减少互残,提高成活率。可以在池底朝阳蔽风面开挖纵槽沟,有利于水温下降后潜沙。

以上措施,对虾、蟹混养池而言,更为重要。

5.2 放养

放养前的清池、肥水等措施同养虾。

5.2.1 蟹苗选择 要求苗壳要硬,活力强、规格较整齐、十足齐全,尤其是大鳌不可缺少。出苗期间,一般要变态为幼蟹。约3个月的养殖可达商品规格,即150g/只以上,再经育肥可达200~250g/只以上,这时经济效益最高。

5.2.2 放养密度 可按每亩10 000~20 000只左右放养。

5.2.3 稚蟹暂养 在蟹的生产刚起步时,暂养措施应受到较高重视,从育苗室培育的幼蟹再集中暂养一段时间有几点益处:(1)可使幼蟹离开育苗池后,有一个变化尽量小的生长环境;(2)水体小,饵料密度增大,

所投饵料可得到最大利用率,摄食机率增多;(3)有利对稚蟹生长发育的观察。一般暂养池设在养成池的一角或用网隔开。或用坝隔开。适时增换水。因这时的稚蟹还未完全进入底栖生活,时常在水中悬游(3~4cm以后,才完全底栖生活),所以透明度要求20~40cm水池中可放适量的海草、稻草耙之类的隐蔽物,1~2个/m²,池底铺10~15cm小沙块层。

增强稚蟹对环境的适应能力。经10~15d生长至甲宽2.5cm以上,进行放养。

5.2.4 放养时间 一般应为5~6月,据调查资料分析,近几年山东莱州湾东北部产卵场出现首批抱卵蟹的时间为4月底~5月上旬,这时水温变化范围为14.5~20.9℃,到5月中旬,则有大批蟹产卵和抱卵。按自然水温培育(平均日水温22~25℃),出苗时间应在6月中旬,待第二批产卵要到6月中上旬孵化,出苗时间要推迟到7月上旬。从饲养生产试验中观察到,7月10日前的出苗稚蟹,10日中旬可生长为商品蟹,但在7月23日以后放苗的稚蟹,当年较难达到商品规格。所以育苗中适当提前升温培育,缩短其育苗期,两次利用亲蟹,是完全可能和必要的。如用人工促肥后越冬雌蟹做亲蟹;应提早升温育苗,争取5月上中旬出苗,这是最佳时间,当年一般可使成蟹长到250g以上。
(待续)

海洋科学