环烷酸对淡水微藻生理生化特征的影响*

林治豪¹ 张焕新² 唐学玺^{1,3} 王 影^{1,3}

(1. 中国海洋大学海洋生命学院 山东青岛 266003; 2. 山东师范大学地理与环境学院 山东济南 250014; 3. 青岛海洋科学 与技术试点国家实验室 海洋生态与环境科学功能实验室 山东青岛 266237)

摘要 环烷酸是高酸原油的主要污染组分,对水生生态系统造成潜在威胁。在不同浓度环烷酸处 理下对两种模式淡水微藻——莱茵衣藻(*Chlamydomonas reinhardtii*)和小球藻(*Chlorella vulgaris*)进行 了 96 h 的连续培养,研究了环烷酸胁迫对两种淡水微藻种群及生理生化特征的影响,旨在为水生生 态系统中环烷酸污染的生态风险预测与规避提供前瞻性的研究资料。研究结果表明,低浓度环烷酸 (0.5~4 mg/L)会刺激淡水微藻的种群增长,而高浓度环烷酸(8~16 mg/L)会抑制淡水微藻的种群增长, 造成急性毒性损伤。低浓度环烷酸处理下两种微藻叶绿素 a 含量上升,脂质积累,高浓度环烷酸处理 下两种微藻叶绿素 a 含量下降而多糖含量上升,推测环烷酸剂量可能会影响淡水微藻能量存储方式。 两种微藻在环烷酸胁迫下均会受到氧化损伤,造成活性氧(reactive oxygen species, ROS)含量上升, 两种微藻抗氧化酶超氧化物歧化酶(superoxide dismutase, SOD)和过氧化氢酶(catalase, CAT)对环烷 酸处理具有种属差异;高浓度环烷酸对淡水微藻的急性损伤具有时间效应,毒性随着胁迫时间的延 长而逐渐增强。综上,环烷酸对淡水微藻的种群及生理过程具有明显的剂量和时间效应,研究结果可 为淡水水生生态系统的环烷酸污染的风险评估提供数据支撑。

关键词 环烷酸; 淡水微藻; 种群动态; 生化特征; 抗氧化酶活性;毒物兴奋效应 中图分类号 X55 doi: 10.11693/hyhz20220400096

随着原油不断开采,世界优质原油的储量逐渐 下降。高酸原油由于储量丰富,价格低廉在国际市场 上越来越受重视(童晓光等,2018)。高酸原油在开采 和运输的过程中,不可避免地会导致高酸石油污染 物的泄漏。环烷酸(naphthenic acids, NAs)天然存在于 石油中,是石油中主要的酸性成分,在高酸原油中大 量存在(田松柏,2005)。作为石油中主要的毒性成分 之一,环烷酸的生态毒性研究成为了石油污染研究 中重要的问题(Clemente *et al*,2005)。了解环烷酸对水 生生态环境的影响对环烷酸污染的风险评估和生态 修复具有重要的意义。

环烷酸是一类环烷基直链羧酸的统称,其分子 中一般含有一个或多个饱和环,通用分子式为 C_nH_{2n+z}O₂,其中 n 代表碳原子数; Z 代表不饱和度, Z 的数值通常是-2的倍数;有些环烷酸还含有芳香酸、 氮、硫等其他元素(Swigert *et al*, 2015)。环烷酸化学 性质稳定,具有低挥发性,分子结构中同时存在烷基 憎水基团和羧基亲水基团,因而具有表面活性剂的 特性,能以分子或者环烷酸盐的形式溶于水并在水 环境中持久存在(Leung *et al*, 2001)。这种可溶性使得 环烷酸具有生物积累性和生物放大效应,大大提高 了环烷酸在水环境中的扩散能力。环烷酸会从石油开 采区渗透并污染附近的湖泊和湿地等水域环境,研 究表明在加拿大的阿尔伯塔采矿区附近的自然湿地 中环烷酸的浓度可达 10~60 mg/L(Clemente *et al*, 2005; Vander *et al*, 2021)。目前已在土壤、地下水、 河流、湖泊、沉积物等环境介质及蚯蚓、淡水鱼等生 物体内检测到环烷酸(Scott *et al*, 2020)。

通信作者: 王 影, 硕士生导师, 副教授, E-mail: ywang@ouc.edu.cn 收稿日期: 2022-04-13, 收修改稿日期: 2022-05-27

^{*} 国家自然科学基金, 41976132 号, 61902368 号, 42176204 号;中央高校基本科研专项资金, 201964025 号;国家自然科学基 金-山东省联合基金, U1606404 号。林治豪,硕士研究生, E-mail: linzhihao@stu.ouc.edu.cn

环烷酸具有较强的生物毒性,已有研究表明环烷 酸对哺乳动物、鸟类、淡水鱼类、两栖类、细菌等具 有很强的生物毒性,影响个体的发育和繁殖、干扰内 分泌系统,甚至造成个体死亡(Li *et al*, 2017)。环烷酸 低剂量长时间的水域毒性效应近几年受到越来越多的 关注。最新研究表明,环烷酸的低剂量长时间的暴露 对斑马鱼等淡水鱼、蚯蚓等具有生殖毒性、内分泌干 扰效应和免疫阻断效应(Quinlan *et al*, 2015)。也有研究 表明,极低的环烷酸浓度(100 µg/L)长期暴露也会对蚍 蜉等水生动物造成慢性损伤(Pomfret *et al*, 2021)。

在前期的实验中发现环烷酸会对三角褐指藻等 海洋微藻造成急性毒性效应(Zhang et al, 2018), 但是 对淡水微藻的研究并未见相关报道。相比于海洋, 陆 域石油的储量更大, 环烷酸等石油污染物对淡水水 域的潜在污染量更大, 污染传播速率更快, 因此亟需 了解环烷酸对淡水域生态系统的危害。淡水微藻是淡 水域生态系统中重要的初级生产者, 在水域生态系 统的营养传递、生产力水平稳定及碳循环等方面均发 挥重要作用。因此, 本实验选用模式微藻——莱茵衣 藻 (Chlamydomonas reinhardtii) 和 小 球 藻 (Chlorella vulgaris)作为受试生物, 研究环烷酸对微藻生理生化 特征的效应机制, 为环烷酸对微藻的毒性效应和兴 奋效应提供理论与实践经验, 同时也为水生生态系 统中环烷酸污染的生态风险预测与规避提供前瞻性 的研究资料。

1 材料与方法

1.1 实验材料

本实验选用模式淡水微藻莱茵衣藻(*Chlamydomonas reinhardtii*)和小球藻(*Chlorella vulgaris*),由中国海洋 大学藻种库提供。藻种的培养使用蒸馏水,培养基为 f/2 培养基(不含硅),培养条件为光照强度 80 μmol photons/(m²·s),光照周期 12 h / 12 h,温度(20±1)°C, pH=7.4±0.1。

根据文献检索及前期现场调查结果, 拟选择水 域环境和生物体内广泛存在的 7 碳环烷酸(C₇H₁₂O₂) 为污染因子。环烷酸购自 Sigma 公司(美国 Sigma-Aldrich 公司, CAS: 1338-24-5)。

1.2 环烷酸的配置及浓度测定

将环烷酸与蒸馏水按照 1:9 的比例进行混合并 倒入烧杯中,然后使用磁力搅拌器在加盖密封、避光 的条件下连续搅拌 24 h,使环烷酸与蒸馏水充分混 匀。避光静置 5 h 后倒取下层水相,为环烷酸母液。 母液使用 0.22 μm 微孔滤膜进行抽滤和除菌, 静置于 4 °C 冰箱内, 避光密封保存并在实验期间保存使用。 环烷酸能够体现亲水性, 因此可以分析出它在水中 的浓度。

采用岛津气相色谱质谱联用仪(日本岛津公司 GCMS-OP2020 NX)进行浓度分析。在这之后检测环 烷酸在水中的具体溶解度。样品的前处理:本研究先 取一定量的样品以丙酮:正己烷为1:1的混合溶剂 萃取,所有样本上层的正己烷通过无水硫酸钠进行 干燥处理,在这以后旋转蒸发,相应的置换溶剂选择 的是正己烷、并通过硅胶和氧化钼构建而成的多段 柱进行净化, 然后将样品旋蒸, 通过氮吹仪进行浓缩 处理之后、将其放置到带螺旋盖样品瓶内、最后完成 GC-MS 分析。测定条件参数: 色谱柱(TG-5MS, 15 m, 0.25 mm, 0.1 μm), 程序升温: 160 °C (2 min), 35°C/min 升温至 320°C (10 min)、检测器根据实际 需求选择的是 EI 离子源、并利用离子扫描的方式、 相应的传输线温度等于 300 °C, 实际的离子源温度 等于 250 °C。采用的载气类型主要为氦气, 具体的载 气流速等于 1.5 mL/min。而对于进样模式来说, 其主 要为 SSL 进样口,其进样量等于 1 μL。结合 GC-MS 测定的数据。进而分析出三组环烷酸母液中所含环 烷酸的实际浓度值, 见表 1。

表1 环烷酸储备液 GC-MS 分析结果表 Tab 1 GC-MS analysis of nanhthenic acid stock solution

Tub.1 Ge wib unarysis of naphtienie dela stock solution				
序号	组分名称	质量百分比%	CAS 编号	
1	环烷酸	12~13	1338-24-5	
2	环烷酸	16~18	1338-24-5	
3	环烷酸	10~13	1338-24-5	

1.3 实验设计

将处于对数生长期的两种淡水微藻接种入 f/2 培 养基,培养基盛于容量为 500 mL 的三角瓶中进行急 性毒性试验,两种微藻的起始浓度分别为 236.5×10⁴ 和 550.6×10⁴ cells/mL。根据预实验的模拟结果,将实 验分为 6 个处理组,每个处理组中环烷酸质量浓度分 别为 0、0.5、2、4、8、16 mg/L,其中 0 mg/L 为空白 对照组,每个实验组设计三个平行实验。实验持续 96 h,每隔 8 h 摇藻一次,防止藻细胞沉淀。在两种微 藻接种后的 0、24、48、72 及 96 h 共 5 个阶段在超 净工作台内进行藻细胞取样。每个时间点分别检测各 个组的种群密度、叶绿素 a 含量(chlorophyll a, chl a), 抗氧化酶过氧化物歧化酶(superoxide dismutase, SOD) 和过氧化氢酶(Catalase, CAT)活性,活性氧(Reactive Oxygen Species, ROS)阳性率和生理生化指标(多糖、蛋白质和粗脂的含量)。

1.4 实验方法

1.4.1 种群密度及抑制率 两种微藻的种群密度 的检测使用血球计数板计数法。每次取样取 1 mL 藻 液,加入 10 μL 的鲁格试剂固定并染色藻细胞。在光 学显微镜(日本 Olympus 公司 CX31)下,使用血细胞 计数板测定细胞密度,并计算藻细胞的种群密度。然 后根据 OECD (1984)规定的方法分析环烷酸对两种 微藻的抑制率:根据每次采样时的藻细胞密度,绘制 出不同浓度环烷酸处理组的藻细胞密度随时间变化 的变化曲线,即生长曲线。然后按照下列公式计算出 抑制率:

$$A = \frac{N_1 - N_0}{2} \times t_1 + \frac{N_1 + N_2 - 2N_0}{2} \times (t_2 - t_1) + \dots + \frac{N_n + N_{n-1} - 2N_0}{2} \times (t_n - t_{n-1}),$$
(1)

$$I_A = \frac{A_0 - A_t}{A_0} \times 100\%, \qquad (2)$$

式中, I_A 表示特定浓度下藻类种群密度的抑制率(%); A 表示生长曲线所包围的面积; A_0 表示 96 h 空白对照 组生长曲线所包围的面积; A_1 表示 96 h 处理组生长曲 线所包围的面积; t_1 表示实验开始后首次测定的时间 (24 h); t_n 表示第 n 次测定的时间(h); t_{n-1} 表示第 n-1 次 测定的时间(h); N_0 表示藻类的起始细胞密度; N_n 表示 t_n 时刻测定的藻细胞的密度(cells/mL); N_{n-1} 表示 t_{n-1} 时刻测定的藻细胞的密度(cells/mL)。

1.4.2 光合色素含量的测定 使用丙酮浸提法检测叶绿素 *a* 的含量。每次取样时取 5 mL 藻液,藻细胞使用 10 mL 体积分数为 90%的丙酮浸提 48 h。浸提后 4 °C 下离心 15 min (4 000 r/min),取上清液备用。叶绿素 *a* 含量通过 UV-8000 紫外分光光度计(上海元析有限公司)进行测定。用体积分数为 90%的丙酮作为空白标零,对样品进行 350~700 nm 的波长扫描,读取 663 和 645 nm 处的吸光度。重复取样 5 次,计算平均值。叶绿素 *a* 的含量按照如下公式计算 (Lichtenthaler *et al*, 1983):

$$c_{\text{chl}\,a} = \frac{(12.7x - 2.69y)}{N},$$
 (3)

式中, $c_{chl a}$ 代表叶绿素 a 的含量($\mu g/cell$), x 和 y分别代表 663 和 645 nm 波长下的吸光值, N代表采样时间点下的细胞密度(cells/mL)。

1.4.3 抗氧化酶活力的测定 粗酶液提取:每次 采样后将150 mL藻液经1.2 μm 孔径的微孔滤膜过滤 后收集滤膜上的藻泥,将藻泥移入冰浴预冷的研钵 内并加入 1 mL 磷酸缓冲液(pH=7.4)和适量石英砂, 在冰浴下将藻泥充分研磨。研磨后的匀浆液 4 °C 下 10 000 r/min 离心 10 min,提取上清液即为粗酶提取 液,放于4°C冰箱保存备用。可溶性蛋白含量的测定, 采用考马斯亮蓝 G-250 法进行。使用 Sigma (美国 Sigma-Aldrich 公司)的 SOD 活性测定试剂盒和 CAT 活性测定试剂盒对粗酶液进行测定。

1.4.4 ROS 阳性率的测定 微藻 ROS 阳性率的检测采用 2'7'-荧光素-乙酰乙酸酯(DCFH-DA)染色法进行 (Zhao *et al*, 2020)。 DCFH-DA 购买自美国 Sigma-Aldrich 公司, CAS 编号为 4091-99-0, 实验前配置为 500 μmol/L 的工作液。每次取样时取 20 mL 藻液, 经 1.2 μm 孔径的微孔滤膜过滤后重悬于 1 mL 的蒸馏水中。取 500 μL 的重悬液并加入 5 μL 的DCFH-DA 工作液, 摇床避光孵育 40 min。随后 4 °C 4 000 r/min 离心两次, 并用 500 μL 蒸馏水重悬沉淀。

最后一次冲洗沉淀的重悬液避光保存在 4 °C, 并在 2 h 内完成检测。使用 CytoFLEX 流式细胞仪(美 国 Beckman 公司),在 FITC 通道(激发光 488 nm,吸 收光为 525~565 nm)检测单个藻细胞二氯荧光素 (DCF)的荧光强度,并根据细胞的染色程度计算出 ROS 阳性率。

1.4.5 粗脂含量的测定 本实验用乙醚-石油醚法 测定微藻粗脂的含量(马帅等, 2010)。每次取样时取 50 mL 藻液, 经1.2 μm 孔径的微孔滤膜过滤后重悬于 1 mL 的蒸馏水中, 在 4 °C 下 8 000 r/min 离心 10 min, 去掉上清, 保留藻泥。藻泥中加入 3 mL 蒸馏水, 超声 破碎 20 min, 然后 8 000 r/min 4 °C 下离心 10 min, 去 掉沉淀, 保留上清液。按照水:乙醚:石油醚=3:1:2 的比例加入乙醚和石油醚, 并在 20 °C 下浸提粗脂 5 h。浸提后取上层有机层, 使用旋转蒸发仪在 60 °C 下 蒸发有机溶剂, 蒸发完全后于 95 °C 干燥 2 h 烘干多 余的水分, 冷却后称量得到粗脂干重。

1.4.6 蛋白质含量的测定 采用考马斯亮蓝 G-250 法测定微藻蛋白质的含量(赵英永等, 2006), 试 剂盒购买自 Sigma 公司(美国 Sigma-Aldrich)。每次取 样时取 40 mL 藻液, 经 1.2 μm 孔径的微孔滤膜过滤 后收集藻泥, 并放入-21 °C 的冰箱中使藻泥完全冷 冻, 然后放入 40 °C 的温水浴 15 min 使藻泥融化, 重 复冻融步骤 3 次使细胞破碎。在藻泥中加入 3 mL 磷酸缓冲液, 超声破碎细胞 20 min。随后在 4 °C 下 6 000 r/min 离心 10 min, 取 1 mL 上清液, 加入 5 mL 考马斯亮蓝后混匀。以蒸馏水组作为空白标零, 在 595 nm 处测定吸光度, 并利用标准曲线算出待测藻 液蛋白质的含量。

1.4.7 多糖含量的测定 采用硫酸-苯酚法测定微 藻的多糖含量(孟迎迎等, 2017)。每次取样时取藻液 40 mL, 经 1.2 μ m 孔径的微孔滤膜过滤后收集藻泥, 并放于-20 °C 的冰箱中使藻泥完全冷冻, 然后放入 40 °C 的温水浴 15 min 使藻泥融化, 重复以上冻融步 骤 3 次使细胞破碎。在藻泥中加入 3 mL 磷酸缓冲液, 超声破碎细胞 20 min。随后在 4 °C 下 6 000 r/min 离 心 10 min, 取 1 mL 上清液, 按照待测液:苯酚:浓 硫酸=1:1:5 的比例加入苯酚和浓硫酸, 混匀 后静置 20 min; 取 1 mL 蒸馏水加入苯酚和浓硫酸, 混匀 后静置 20 min 作为蒸馏水组。待反应完全后用蒸馏 水组标零, 在 490 nm 处测定吸光度, 并利用标准曲 线算出待测藻液蛋多糖的含量。 1.4.8 数据的统计与分析 使用 IBM SPSS Statistics 25 (美国 SPSS公司)软件对实验中所有的数 据进行单因素方差分析(One-way ANOVA),检验处 理组和对照组差异的显著性。数据首先进行方差齐性 检验,数据等方差时使用 LSD (Least Significant Difference,最小显著性差异法)分析和 S-N-K (Student Newman Keuls)检验,不等方差时使用塔姆黑尼T2检 验差异显著性,显著性水平设定为 0.05。

2 结果

2.1 不同浓度环烷酸对微藻种群增长的影响

如图 1a 所示, 莱茵衣藻在 48~72 h, 0.5~2 mg/L 环烷酸胁迫组细胞密度明显高于对照组 (*P*<0.05); 8 和 16 mg/L 环烷酸胁迫组细胞密度均低于对照组, 差 异极显著(*P*<0.01)。在 96 h, 8 和 16 mg/L 环烷酸胁迫 组细胞密度低于对照组, 差异极显著(*P*<0.01)。如图 1b 所示,小球藻在 24~72 h, 0.5~4 mg/L 环烷酸胁迫组 细胞密度 明显高于对照组, 差异显著(*P*<0.05)。 72~96 h, 8~16 mg/L 环烷酸胁迫组细胞密度明显低于



图 1 莱茵衣藻(a)和小球藻(b)在不同浓度剂量环烷酸胁迫下,不同受试时间的生长曲线;不同浓度环烷酸处理 96 h 下两 种微藻的种群抑制率(c)



对照组,差异极显著(P<0.01)。如图 1c 所示,根据环 烷酸对两种微藻的种群抑制率结果,低浓度剂量处 理下(0.5~4 mg/L),环烷酸能够刺激两种微藻的种群 增长;高浓度剂量处理下(8~16mg/L),环烷酸则对两 种微藻表现出明显的抑制效应。

2.2 不同浓度环烷酸对微藻叶绿素含量的影响

图 2 描述了不同环烷酸浓度剂量胁迫下两种微 藻叶绿素 a 含量随着受试时间的变化。如图 2a 所示, 与对照组相比, 24~96 h 内高浓度环烷酸 (8~16 mg/L) 处理组莱茵衣藻的叶绿素含量显著降低(P<0.01), 且



随着时间的变化色素含量持续降低。96 h 下, 莱茵衣 藻色素含量呈现出剂量效应: 0.5~16 mg/L 内, 环烷酸 浓度越高, 对莱茵衣藻色素含量的呈现出越强的抑 制趋势。24~96 h 内高浓度环烷酸(8~16 mg/L)处理组 小球藻的叶绿素 *a* 含量表现出与莱茵衣藻相同的变 化趋势(图 2b), 均抑制了小球藻的叶绿素 *a* 含量, 其 中 72 和 96 h 与对照组相比差异极显著(*P*<0.01)。环 烷酸浓度为 0.5~4 mg/L 的处理组对小球藻的叶绿素 *a* 含量具有一定的促进作用, 其中 48 h 叶绿素 *a* 的含量 与对照组相比差异显著(*P*<0.05)。





2.3 不同浓度环烷酸对微藻 SOD 活性的影响

图 3 描述了不同剂量的环烷酸胁迫下两种微藻 抗氧化酶活性的变化,其中图 3a, 3b 描述了两种微藻 SOD 酶活力的变化;图 3c, 3d 描述了两种微藻 CAT 酶活力的变化。如图 3a 所示、在 24 h 环烷酸暴露初 期,浓度为 2~8 mg/L 的环烷酸处理组莱茵衣藻的 SOD 活性呈现上升趋势, 与对照组相比差异显著 (P<0.05), 2 mg/L 处理组表现出极显著差异(P<0.01)。 随着时间的推移、浓度为 2~4 mg/L 的环烷酸处理组 莱茵衣藻的 SOD 值明显高于处理组、差异极显著 (P<0.01)。96 h 下, 2~4 mg/L 的环烷酸处理组莱茵衣 藻的活性呈现上升趋势, 8 和 16 mg/L 的环烷酸处理 组莱茵衣藻 SOD 活性呈现显著下降的趋势(P<0.01)。 如图 3b 所示、与莱茵衣藻相同、环烷酸在 24 h 暴露 初期刺激小球藻的 SOD 活性, 其中 8 mg/L 处理组的 小球藻 SOD 活性和对照相比显著升高(P<0.05)。在 48 h下,不同浓度的环烷酸对小球藻表现出显著的刺 激效应,和对照组相比,2和4mg/L处理组小球藻的 SOD 活性显著升高(P<0.05); 8 mg/L 和 16 mg/L 处理 组小球藻的 SOD 活性极显著升高(*P*<0.01)。在环烷酸 暴露的后期, 72 和 96 h 内, 2 和 4 mg/L 环烷酸对小球 藻 SOD 活性的刺激效应逐渐减弱, 而在 96 h 下高浓 度环烷酸(8 和 16 mg/L)处理对小球藻 SOD 活性表现 出显著的抑制效应(*P*<0.01)。

如图 3c 和图 3d 所示, 24~96 h 低浓度环烷酸处 理(0.5~4 mg/L)和高浓度环烷酸处理(8 和 16 mg/L) 下莱茵衣藻和小球藻的 CAT 酶活力与 SOD 酶活力 的变化基本趋势一致。96 h 下低浓度处理组(2 和 4 mg/L)莱茵衣藻的 CAT 酶活性显著高于空白对照组, 高浓度环烷酸处理组(8 和 16 mg/L)莱茵衣藻和小球 藻的 CAT 酶活性显著低于空白对照组。

2.4 不同浓度环烷酸对微藻活性氧阳性率的影响

图 4 描述了不同浓度的环烷酸胁迫下两种微藻 ROS 阳性率的变化。如图 4a 所示, 2 mg/L 和 4 mg/L 环烷酸处理下在 24 h 和 48 h 会降低莱茵衣藻 ROS 的 阳性率, 72 h 和 96 h 不会显著影响莱茵衣藻的 ROS 阳性率。8 和 16 mg/L 环烷酸处理下在 24~96 h 均会 造成莱茵衣藻的 ROS 阳性率显著上升(*P*<0.05), 其中 48 h 和 96 h 下两种浓度处理组的莱茵衣藻的 ROS 阳性率表现为极显著上升(P<0.01)。如图 4b 所 示, 0~96 h, 0.5~4 mg/L 环烷酸对小球藻的 ROS 阳性 率没有显著变化。8 和 16 mg/L 环烷酸处理下在 24~48 h 造成小球藻 ROS 阳性率的下降, 其中 8 mg/L 处理 组的小球藻 ROS 阳性率和对照组相比表现出显著下降(*P*<0.05); 8 和 16 mg/L 环烷酸处理在 72 和 96 h 造成小球藻 ROS 阳性率逐渐上升, 96 h 两种浓度处理下小球藻 ROS 阳性率和对照组相比极显著上升(*P*<0.01)。









图 4 不同浓度环烷酸剂量胁迫下莱茵衣藻(a)、小球藻(b)的 ROS 阳性率在不同时间下的变化 Fig.4 The effect of different NAs concentrations on the ROS positive rate of *C. reinhardtii* (a) and *C. vulgaris* (b) in different durations 注: **代表 *P* < 0.01(差异极显著), *代表 *P* < 0.05(差异显著)

⁶⁰[a

40

20

0

0

粗脂含量/(10⁻⁹ mg/cell)

2.5 不同浓度环烷酸对微藻粗脂含量的影响

处理浓度为 0.5~4 mg/L 的环烷酸在 24~48 h 对莱 茵衣藻的粗脂含量表现出抑制作用,其中 48 h 下 0.5 mg/L 和 2 mg/L 处理组和对照组相比表现出显著 差异(P<0.05);在 72~96 h 对莱茵衣藻的粗质含量表 现出刺激效应,96 h 下 0.5~4 mg/L 的环烷酸处理组莱 茵衣藻的粗脂含量极显著高于对照组(P<0.01)。 8 mg/L 的环烷酸在 24 h 显著刺激莱茵衣藻粗脂的含 量(P<0.05),在 72 h 和 96 h 对莱茵衣藻的粗脂含量则 表现出抑制效应(P<0.05)。16 mg/L 的环烷酸在 24~ 96 h 对莱茵衣藻的粗质含量均表现出显著的抑制效 应(P<0.01)。图 5b 描述了不同浓度的环烷酸处理对小 球藻粗脂含量的影响,不同浓度环烷酸处理组小球 藻的粗脂含量与莱茵衣藻表现出了相同的变化趋势。 不同的是 4 mg/L 的环烷酸处理下在 24 h 和 96 h 对小 球藻粗脂含量表现出刺激效应(P<0.05)。

2.6 不同浓度环烷酸对微藻蛋白质含量的影响

如图 6a 所示,在 24 h 环烷酸暴露初期,浓度为 8 和 16 mg/L 环烷酸处理组的莱茵衣藻的蛋白质含量 呈现上升趋势,和对照组相比差异极显著(P<0.01)。 暴露 48 h 后,浓度为 0.5~16 mg/L 的环烷酸表现出 刺激莱茵衣藻蛋白质含量的趋势,其中 2 mg/L 处理 组表现为显著差异(P<0.01),4~16 mg/L 处理组表现 为极显著差异(P<0.05)。随着时间的增加,在 96 h 下,各个处理组的莱茵衣藻蛋白质的含量呈现出下 降的趋势,和对照相比差异极显著(P<0.01)。如图 6b 所示,24 h 下,2、8 和 16 mg/L 环烷酸处理会刺激小 球藻蛋白质的含量(P<0.05)。而在 48~96 h,所有浓 度的环烷酸处理均会抑制小球藻的蛋白质的含量, 其中 8 mg/L 环烷酸处理组的小球藻在 72 和 96 h







图 6 不同剂量浓度环烷酸胁迫下莱茵衣藻(a)、小球藻(b)蛋白质含量在不同时间下的影响 Fig.6 The effect of different NAs concentrations on the protein content of *C. reinhardtii* (a) and *C. vulgaris* (b) in different durations 注: ** 代表 *P* < 0.01(差异极显著), *代表 *P* < 0.05(差异显著)

的蛋白质含量显著低于对照组(P<0.05),48 h 下蛋白质 含量极显著降低(P<0.01);16 mg/L 的环烷酸处理组的 小球藻在 48~96 h 蛋白质含量显著低于对照组 (P<0.01)。

2.7 不同浓度环烷酸对微藻多糖含量的影响

图 7 描述了不同浓度环烷酸胁迫下,两种微藻 多糖含量的变化。如图 7a 所示,8 mg/L 环烷酸在 24~96 h 对莱茵衣藻多糖含量表现出刺激效应,其 中 24 h 和 96 h 表现为显著刺激(*P*<0.05),72 h 表现 为极显著刺激(*P*<0.01)。16 mg/L 环烷酸在 24~96 h 对莱茵衣藻多糖含量表现出极显著的刺激效应 (P<0.01)。0.5~4 mg/L 环烷酸在 24~96 h 不会显著 影响莱茵衣藻多糖的含量。不同浓度环烷酸在 24 h 会刺激小球藻多糖含量,2 和 8 mg/L 处理组表现为 显著刺激(P<0.05),4 和 16 mg/L 处理组表现为极显 著刺激(P<0.01)。48 h 下 8 和 16 mg/L 环烷酸处理 会极显著刺激小球藻多糖含量(P<0.01)。在 72~96 h 不同浓度环烷酸对小球藻多糖含量无显著变化,但 2 mg/L 环烷酸处理在 96 h 显著刺激小球藻多糖含 量(P<0.01)。



图 7 不同剂量浓度环烷酸胁迫下莱茵衣藻(a)、小球藻(b)多糖含量在不同时间下的影响 Fig.7 The effect of different NAs concentrations on the polysaccharide content of *C. reinhardtii* (a) and *C. vulgaris* (b) in different durations 注: ** 代表 *P* < 0.01(差异极显著), *代表 *P* < 0.05(差异显著)

3 讨论

本研究根据环境浓度设置了实验浓度为 0.5、2、 4、8 和 16 mg/L 的环烷酸处理组,发现 0~96 h 所有 剂量的环烷酸均对莱茵衣藻和小球藻的种群增长和 生理生化特征造成了一定的影响。在 96 h 下,不同浓 度环烷酸胁迫下两种淡水微藻均表现出了高度一致 的毒性效应:96 h 内低浓度环烷酸胁迫(0.5~4 mg/L) 对淡水微藻造成持续的毒性兴奋效应,刺激了微藻 种群的增长;96 h 下高浓度环烷酸胁迫(8~16 mg/L)会 对淡水微藻造成急性毒性效应,抑制种群增长。研究 结果表明环烷酸对淡水微藻的种群及生理过程具有 明显的剂量和时间效应,高酸原油污染能对水生生 态系统的稳定造成潜在威胁,因此,环烷酸应作为高 酸石油泄漏风险区的重点监测对象。

伴随着实验浓度的增加,环烷酸对淡水微藻的 抑制效应也相应地增加。8 和 16 mg/L 环烷酸处 理组中莱茵衣藻和小球藻的种群增长几乎停滞。在溢 油事故区或原油开采区环烷酸的浓度为 10~60 mg/L (Clemente et al, 2005; Vander et al, 2021), 远高于实 验设置的浓度, 说明石油污染事故中, 环烷酸是造成 生态破坏的重要组分之一。在低浓度环烷酸处理组中 (0.5、2和4mg/L)、环烷酸可以促进莱茵衣藻和小球 藻的种群生长、这种低浓度、短时间引起生物体产生 刺激性的毒性效应, 被称为毒物兴奋效应(Calabrese et al, 1999)。这种反应主要根据生物体内自身的毒物 适应机制所决定、一般表现在低浓度毒物刺激下造 成生物体某些生理生化过程过度表达、并对其生长 发育起到积极的作用。欧晓明等(2003)发现较低浓度 (1 mg/L)的新型除草剂 HNPC-C9908 作用于小球藻时 表现出明显的生长刺激作用, 而高浓度(>25 mg/L)则 使藻细胞生长缓慢、细胞叶绿体解体。低浓度的多溴 联苯醚处理海水小球藻(0.1~3 μg/L)、牟氏角毛藻

(0.1~5 μg/L)和赤潮异弯藻(0.1~1 μg/L)对藻体生长具 有短暂的促进作用(李卓娜, 2009)。溢油事故中,环烷 酸经过长期的稀释降解后,由高浓度抑制效应转为 低浓度刺激效应,可能导致溢油后藻华频繁的爆发 (周利等, 2013)。

不同浓度环烷酸处理对两种淡水微藻的生理生 化特征的影响与种群密度的影响一致、低浓度环烷 酸下(0.5、2 和 4 mg/L)在 96 h 对两种淡水微藻表现出 促进脂质、蛋白质等物质积累的趋势; 高浓度环烷酸 处理下(8~16 mg/L)在 96 h 对莱茵衣藻和小球藻则表 现出抑制效应, 叶绿素 a 的含量和脂质的含量下降而 多糖含量上升。叶绿素 a 是植物体内重要的捕光色素、 其含量可以直接影响光合效率。蔡卓平(2009)在研究 微藻的毒性兴奋效应时发现低浓度有机磷农药会刺 激微藻体内的叶绿素 a 含量升高、提高植物的固碳 效率并刺激蛋白质的合成转运、进而使得藻细胞生 长旺盛、分裂速度加快。不同浓度的环烷酸在 96 h 内通过抑制或者促进淡水微藻体内叶绿素 a 的含量 上升、影响淡水微藻光合固碳的能力、进而影响种 群增长速率。低浓度环烷酸胁迫会刺激叶绿素 a 的 含量增加从而加强光合固碳效率、而高浓度环烷酸 胁迫则会抑制叶绿素 a 的含量,降低光合固碳的效 率。光合效率在脂质合成中也发挥了重要的作用。 脂质是高度还原的化合物、合成时需要大量光合作 用中的产物还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸 (reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, NADPH)作为还原剂(Li-Beisson et al, 2019)。低浓度 环烷酸刺激淡水微藻的光合效率上升,产生大量的 NADPH 和三磷酸腺苷(ATP)可用于叶绿体中脂质的 合成,导致脂质过量积累。但是高浓度环烷酸刺激下, 光合作用受到抑制、NADPH 等光合作用中间产物含 量下降,导致脂质合成受阻。在高浓高度环烷酸胁迫 下, 微藻细胞的 ROS 阳性率上升, 细胞受到严重的 氧化损伤、细胞也可能通过减少脂质的合成以对抗 氧化损伤。研究表明由于脂质是高度还原的化合物、 机体内过多的 ROS 会介导脂质的氧化、形成丙二醛 等脂质过氧化物对细胞造成严重损伤,因此当藻类 细胞受到严重的氧化应激时、细胞内会协调脂质储 存在塑球蛋白中并从叶绿体运往胞质进行降解等行 为以减少胞内脂质的含量(Xu et al. 2020)。在环烷酸 的胁迫下、两种淡水微藻多糖的含量在高浓度环烷 酸刺激下显著上升、说明多糖类物质在淡水微藻适 应环烷酸胁迫时发挥了重要的作用。淀粉性多糖是植 物体重要的储能物质。和脂质相比,多糖类物质没有 还原性,且合成时不需要大量的 NADPH 提供还原力, 可能是淡水微藻应对高浓度环烷酸时主要的储能物 质。同时,功能性多糖的增加可以帮助淡水微藻调节 胞内渗透压、提高抗氧化活性从而适应高浓度环烷酸 的胁迫。可溶性多糖是植物体内进行渗透调节的重要 物质,并具有清除植物体内 ROS、激活抗氧化酶活性 的作用(张露,2020)。研究表明慈姑多糖、枸杞多糖 等多糖类物质具有抗氧化活性和抑制细胞凋亡等作 用,在面对金属离子胁迫和抵抗细菌污染等发挥了 重要的作用 (Liu *et al*, 2022a, 2022b)。因此多糖类物 质在储能和抗氧化活性上对淡水微藻适应高浓度环 烷酸胁迫都可能发挥了重要的作用。

所有环烷酸处理组中、两种海洋微藻都表现出 了显著的氧化应激效应。低浓度环烷酸处理组(0.5、2 和 4 mg/L)的莱茵衣藻和小球藻 SOD 和 CAT 酶活性 显著上升, ROS 水平维持在相对稳定的状态, 说明抗 氧化酶在微藻体内对环烷酸造成的氧化损伤发挥了 积极的作用。高浓度环烷酸处理组(8~16 mg/L)的莱茵 衣藻和小球藻 SOD 和 CAT 活性显著降低且 ROS 含 量上升、说明高浓度环烷酸会对淡水微藻造成严重 的氧化损伤并破坏微藻体内的抗氧化酶系统、对微 藻造成不可恢复的氧化损伤。在适应环烷酸造成的氧 化胁迫时、莱茵衣藻和小球藻的抗氧化酶酶活表现 出了种属差异、小球藻 SOD 和 CAT 活性的增加幅度 显著低于莱茵衣藻: 低浓度环烷酸胁迫下、小球藻表 现出了更稳定的 ROS 水平说明小球藻比莱茵衣藻更 容易适应环烷酸造成的氧化损伤。SOD 和 CAT 是生 物体抗氧化机制的中心酶之一, SOD 和 CAT 活性的 增加表示氧化损伤的增加, 几乎所有的氧化胁迫都 可以诱导 SOD 活性的显著增加(杨国远等, 2012)。在 石油中其他的多环芳烃的研究中同样发现:低浓度 刺激微藻生长时,会造成氧化应激反应;高浓度抑制 反应时、造成氧化损伤(洪有为等, 2008)、与本实验 结果一致。

尽管 96 h 下高浓度处理组的莱茵衣藻和小球藻 的各项生理指标都表现出抑制效应,但是通过不同 时间下的生理指标可以发现: 8 mg/L 处理组的莱茵衣 藻和小球藻的 SOD 活性、CAT 活性、粗脂含量和蛋 白质含量,16 mg/L 处理组的莱茵衣藻和小球藻蛋白 质含量在暴露初期都表现出了刺激效应。这说明高浓 度环烷酸对微藻的毒性抑制具有时间效应。高浓度环 烷酸暴露的初期,莱茵衣藻和小球藻的抗氧化系统 和脂质、蛋白质等也会受到毒性兴奋效应,积极抵御 环烷酸造成的氧化损伤。但是随着暴露时间的推移, 高浓度环烷酸造成的毒性逐渐增强,ROS 含量升高, 导致两种微藻抗氧化系统被破坏,并进一步造成种 群抑制的现象。

4 结论

低浓度的环烷酸(0.5~4 mg/L)会造成淡水微藻 96 h 持续的毒物兴奋效应、刺激种群增长; 高浓度的 环烷酸(8~16 mg/L)会造成淡水微藻急性毒性效应, 抑制种群生长。不同浓度的环烷酸胁迫均会影响淡水 微藻的生理活性。低浓度环烷酸处理会刺激淡水微藻 的叶绿素 a 含量积累, 导致光合效率升高, 脂质积累 量上升,有利于种群增长。高浓度环烷酸处理会抑制 叶绿素 a 的含量并受到急性的过氧化损伤、导致脂质 含量下降、并积累多糖类物质用干储能和抵抗环烷 酸胁迫。环烷酸会对淡水微藻造成氧化损伤、造成 ROS 含量上升, 且两种微藻的抗氧化酶 SOD 和 CAT 对环烷酸处理具有种属差异。研究还发现高浓度环烷 酸对淡水微藻的急性损伤具有时间效应、毒性随着 胁迫时间的延长而逐渐增强。综上,本研究发现低浓 度环烷酸对浮游植物具有兴奋效应;高浓度环烷酸 对浮游植物具有时间依赖的急性毒性效应、原因可 能是环烷酸剂量影响了淡水微藻的能量存储方式。

参考文献

- 马帅, 付莉莉, 汪萌, 等, 2010. 从微藻中提取粗脂的方法比 较[J]. 中国油脂, 35(5): 77-79.
- 田松柏, 2005. 原油中石油酸的分析与分布规律研究[J]. 石油 化工腐蚀与防护, 22(2): 1-5.
- 李卓娜, 2009. 2, 2', 4, 4' -四溴联苯醚(BDE-47)对 4 种海洋微藻 的毒性效应研究[D]. 青岛: 中国海洋大学: 24-26.
- 杨国远, 万凌琳, 雷学青, 等, 2014. 重金属铅、铬胁迫对斜生 栅藻的生长、光合性能及抗氧化系统的影响[J]. 环境科学 学报, 34(6): 1606-1614.
- 张露, 2021. 一株耐酸微藻的分离鉴定及其对金属离子胁迫的 生理响应[D]. 合肥: 合肥工业大学: 34-38.
- 欧晓明, 雷满香, 黄明智, 等, 2003. 新除草剂 HNPC-C9908 对小球藻生长的影响研究[J]. 农药学学报, 5(3): 16-23.
- 周利, 唐丹玲, 孙景, 2013. 海洋溢油后浮游植物藻华观测分 析和机制探讨[J]. 生态科学, 32(6): 692-702.
- 孟迎迎,姚长洪,刘娇,等,2017. 微藻生物质成分检测方法 评述[J]. 中国生物工程杂志,37(7):133-143.
- 赵英永, 戴云, 崔秀明, 等, 2006. 考马斯亮蓝 G-250 染色法测 定草乌中可溶性蛋白质含量[J]. 云南民族大学学报(自然 科学版), 15(3): 235-237.
- 洪有为, 袁东星, 2008. 典型多环芳烃对红树林区硅藻的毒性 效应[J]. 海洋环境科学, 27(4): 338-342.

- 童晓光, 张光亚, 王兆明, 等, 2018. 全球油气资源潜力与分 布[J]. 石油勘探与开发, 45(4): 727-736.
- 蔡卓平, 2009. 有机磷农药对海洋微藻的毒物兴奋效应及其机 理研究[D]. 广州: 暨南大学: 77-79.
- CALABRESE E J, BALDWIN L A, HOLLAND C D, 1999. Hormesis: a highly generalizable and reproducible phenomenon with important implications for risk assessment [J]. Risk Analysis, 19(2): 261-281.
- CLEMENTE J S, FEDORAK P M, 2005. A review of the occurrence, analyses, toxicity, and biodegradation of naphthenic acids [J]. Chemosphere, 60(5): 585-600.
- LEUNG S S C, MACKINNON M D, SMITH R E H, 2001. Aquatic reclamation in the Athabasca, Canada, oil sands: naphthenate and salt effects on phytoplankton communities [J]. Environmental Toxicology and Chemistry, 20(7): 1532-1543.
- LI-BEISSON Y, THELEN J J, FEDOSEJEVS E, *et al*, 2019. The lipid biochemistry of eukaryotic algae [J]. Progress in Lipid Research, 74: 31-68.
- LI C, FU L, STAFFORD J, *et al*, 2017. The toxicity of oil sands process-affected water (OSPW): a critical review [J]. Science of the Total Environment, 601-602: 1785-1802.
- LICHTENTHALER H K, WELLBURN A R, 1983. Determinations of total carotenoids and chlorophylls *a* and *b* of leaf extracts in different solvents [J]. Biochemical Society Transactions, 11(5): 591-592, doi: 10.1042/bst0110591.
- LIU J F, LI Y C, PU Q S, et al, 2022b. A polysaccharide from Lycium barbarum L.: structure and protective effects against oxidative stress and high-glucose-induced apoptosis in ARPE-19 cells [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 201: 111-120.
- LIU H S, ZHOU M Y, ZHANG X, *et al*, 2022a. *Sagittaria sagittifolia* polysaccharide protects against six-heavy-metalinduced hepatic injury associated with the activation of Nrf2 pathway to regulate oxidative stress and apoptosis [J]. Journal of Inorganic Biochemistry, 232: 111810.
- OECD, 1984, OECD Guidelines for the testing of chemicals, section 2 [M] // Test No. 207: Earthworm, Acute Toxicity Tests. Paris, France: OECD, doi: 10.1787/9789264070042-en.
- POMFRET S M, BRUA R B, MILANI D, et al, 2021. Metabolomic analysis of hexagenid mayflies exposed to sublethal concentrations of naphthenic acid [J]. Frontiers in Molecular Biosciences, 8: 669082.
- QUINLAN P J, TAM K C, 2015. Water treatment technologies for the remediation of naphthenic acids in oil sands process-affected water [J]. Chemical Engineering Journal, 279: 696-714.
- SCOTT A C, ZUBOT W, DAVIS C W, et al, 2020. Bioaccumulation potential of naphthenic acids and other ionizable dissolved organics in oil sands process water (OSPW) – A review [J]. Science of the Total Environment, 712: 134558.
- SWIGERT J P, LEE C, WONG D C L, *et al*, 2015. Aquatic hazard assessment of a commercial sample of naphthenic acids [J]. Chemosphere, 124: 1-9.
- VANDER MEULEN I J, KLEMISH J L, PERU K M, et al, 2021.

Molecular profiles of naphthenic acid fraction compounds from mine lease wetlands in the Athabasca Oil Sands Region [J]. Chemosphere, 272: 129892.

XU C C, FAN J L, SHANKLIN J, 2020. Metabolic and functional connections between cytoplasmic and chloroplast triacylglycerol storage [J]. Progress in Lipid Research, 80: 101069.

ZHANG H X, TANG X X, SHANG J G, et al, 2018. The effect of

naphthenic acids on physiological characteristics of the microalgae *Phaeodactylum tricornutum* and *Platymonas helgolandica* var. *tsingtaoensis* [J]. Environmental Pollution, 240: 549-556.

ZHAO Y R, TANG X X, QU F Y, et al, 2020. ROS-mediated programmed cell death (PCD) of *Thalassiosira pseudonana* under the stress of BDE-47 [J]. Environmental Pollution, 262: 114342.

EFFECT OF NAPHTHENIC ACID ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF FRESHWATER MICROALGAE

LIN Zhi-Hao¹, ZHANG Huan-Xin², TANG Xue-Xi^{1, 3}, WANG Ying^{1, 3}

(1. College of Marine Life Sciences, Ocean University of China, Qingdao 266003, China; 2. College of Geography and Environment, Shandong Normal University, Jinan 250014, China; 3. Laboratory for Marine Ecology and Environmental Science, Pilot National Laboratory for Marine Science and Technology (Qingdao), Qingdao 266237, China)

Two models of freshwater microalgae, Chlamvdomonas reinhardtii and Chlorella vulgaris, were Abstract continuously cultured for 96 h under different concentrations of naphthenic acids (NAs). The effects of NAs stress on the population and physiological and biochemical characteristics of two freshwater microalgae were studied. Results show that low concentrations of NAs (0.5~4 mg/L) stimulated the population growth of microalgae, while high concentrations of NAs (8~16 mg/L) inhibited the population of microalgae growth, causing acute toxic damage. Treatment of NAs could change the physiological activity of microalgae. In low-concentration NAs treatment, content of chlorophyll a in the two microalgae increased and lipids accumulated, and in the treatment with high concentration of NAs, the content of chlorophyll a in the two microalgae decreased and the content of polysaccharide increased. Both microalgae were subjected to oxidative damage under NAs stress, causing an increase in reactive oxygen species (ROS) content; and two microalgal antioxidant enzymes, i.e., superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) showed species-specific differences in the response to NAs treatment. In addition, high concentrations of NAs had a time effect on the acute injury of freshwater microalgae, and the toxicity gradually increased with the increase of experimental duration. Therefore, low concentrations of NAs have stimulant effects on microalgae and high concentrations of NAs have time-dependent acute toxic effects on microalgae growth. This study provided a data-support for the risk assessment of NAs pollution in freshwater environments.

Key words Naphthenic acid; freshwater microalgae; population dynamics; biochemical characteristics; antioxidant enzyme activity; stimulant effect